

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA





SZÉCHENYI TERV

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében
Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén
az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,
az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,
és a Balassi Kiadó
közreműködésével.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.



ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

Logika és érveléstechnika

6. hét

ELSŐRENDŰ LOGIKA 2.

Készítette: Mittelholcz Iván
Szakmai felelős: Mittelholcz Iván

2011. február

Készült a következő mű felhasználásával:

Ruzsa Imre–Máté András: Bevezetés a modern logikába. Osiris, 1997.

változó értékelése: szabad változóhoz faktuális értéket rendelünk
(a tárgyalási univerzum valamely elemét)

- az értékelést mindig adott interpretáció *függelékeként* készítjük el
 - elsőrendű interpretáció: tárgyalási univerzum; predikátumok terjedelme; nevek jelölete
- a változók értékelésével a nyitott mondatok is igazságértéket kapnak
- a változók *értékelésével* megadható a kvantifikált mondatok igazságfeltétele

univerzális állítás $\forall x(A)$ adott interpretáció mellett igaz, ha x -nek nincs olyan értékelése, amire A hamis lesz; $\forall x(A)$ hamis, ha van ilyen értékelés.

egzisztenciaállítás $\exists x(A)$ adott interpretáció mellett igaz, ha x -nek van olyan értékelése, amire A igaz lesz; $\exists x(A)$ hamis, ha nincs ilyen értékelés.

Megjegyzések

- alapesetben A olyan nyitott mondat, amelyben x -nek szabad előfordulása van
- azonban A zárt mondat is lehet

zárt mondat kvantifikálása

$\forall x(\text{okos}(Janka))$

Helyettesítés:

- ha A formula, akkor $A^{a/x}$ jelöli az a formulát, amiben x A -ban lévő szabad előfordulásait ' a ' névvel helyettesítjük
 - $A^{a/x}$ nem ugyanaz, mint az értékelés – egy individuumnak több neve is lehet
 - ha A -ban nincs x -nek szabad előfordulása, akkor $A^{a/x} \Leftrightarrow A$

Következtetések:

- ha mindenre igaz, a -ra is igaz: $\forall x(A) \Rightarrow A^{a/x}$
- ha a -ra igaz, akkor van amire igaz: $A^{a/x} \Rightarrow \exists x(A)$
- összevonva: $\forall x(A) \Rightarrow \exists x(A)$
 - feltétel: a tárgyalási univerzum nem lehet üres ($U \neq \emptyset$)

Összetett kvantifikált mondatok 1.

6. hét

Mittelholcz Iván

Értékelés

Kvantifikált
állítások

Azonosság

Deskripció

Leggyakoribb típusok

univerzális állítás

Minden holló fekete.

- hamis akkor, ha van olyan holló, amely nem fekete
- *Minden holló fekete.* $\not\leftrightarrow$ *Minden fekete holló.*
- kondicionálissal formaizálva: $F(x)$: x fekete; $H(x)$: x holló

$$\forall x(F(x) \supset H(x))$$

- predikátumterjedelmeket tekintve: $F \subseteq H$, azaz F minden eleme H -nak is eleme

egzisztenciaállítások

Van olyan holló, amely fekete.

- igaz akkor, ha van (legalább egy) valami, ami holló és fekete
- *Van olyan holló, amely fekete.* \Leftrightarrow *Van olyan fekete (valami), ami holló.*
- konjunkcióval formalizálva: $F(x)$: x fekete; $H(x)$: x holló

$$\exists x(F(x) \& H(x))$$

- predikátum terjedelmeket tekintve: $F \cap H \neq \emptyset$, azaz F és H nem diszjunkt halmazok, van közös elemük

példa

Minden ember halandó.

Szókratész ember.

Szókratész halandó.

- formalizálva: $\{\forall x(E(x) \supset H(x)), E(sz)\} \Rightarrow H(sz)$
- : $\forall x(A) \Rightarrow A^{a/x}$ alapján

$$\{\forall x(E(x) \supset H(x))\} \Rightarrow E(sz) \supset H(sz)$$

- modus ponens: $\{E(sz) \supset H(sz), E(sz)\} \Rightarrow H(sz)$

Összetett kvantifikált állítások tagadása

6. hét

Mittelholcz Iván

Értékelés

Kvantifikált
állítások

Azonosság

Deskriptió

univerzális állítás tagadása

Nem minden holló fekete.

Van olyan holló, amely nem fekete.

- halmazokkal: $H \setminus F \neq \emptyset$
- formalizálva: $\sim \forall x(H(x) \supset F(x)) \Leftrightarrow \exists x(H(x) \& \sim F)$

egzisztenciaállítás tagadása

Nincs fehér holló.

Minden holló nem fehér.

- halmazokkal: $A \cap B = \emptyset$
- formalizálva: $\sim \exists x(H(x) \& F(x)) \Leftrightarrow \forall x(H(x) \supset \sim F(x))$

Az univerzális állítás furcsaságai

Ha a kondicionális előtagjának predikátumterjedelme üres, akkor az univerzális állítás igaz.

példák

Minden alma finom.

- $U =$ a kosár
- nincs alma a kosárban

Minden pegazusnak két szárnya van.

- ha az előtag üres terjedelmű, akkor akkor az előtag hamis
- hamis előtagú kondicionális mindig igaz
- az univerzális állítás is igaz lesz (nincs olyan értékelés, ami mellet a kondicionális hamis lenne)

A furcsaságok haszna

- normatív állítások akkor is igazak lehetnek, ha senki nem tartja be őket

normatív állítások

Jó tett helyébe jót várj.

- szűk tárgyalási univerzumban is igazak a törvényszerűségek

szűk tárgyalási univerzum

Akinek rossz az érettségije, az nem tanulhat tovább.
(*U olyan osztály, ahol mindenki jól érettségizett*)

- ha mégis fel akarjuk használni következtetésben, hogy nincs üres terjedelmű előtag, akkor egy plusz premisszát kell felvenni (a „*Minden alma finom*” mellé „*Van almá*”-t)

fordított formalizálás

Mindenki bűnös, aki fűre lép.

minden x -re: $\text{fűrelép}(x) \supset \text{bűnös}(x)$

határozott névelő

A kecske párosujjú patás.

határozatlan névelő

Ha egy háromszög derékszögű, akkor a befogók négyzetének összege egyenlő az átfogó négyzetével.

bármely, akármely

Akárki megmondhatja, hol van a kastély.

Bármelyik háromszög belső szögeinek összege 180 fok.

Értékelés

Kvantifikált
állítások

Azonosság

Deskriptó

csak aki

A fűre csak a kertészek léphetnek.

Csak aki kertész, léphet a fűre.

Aki nem kertész, nem léphet a fűre.

minden x -re: $\text{fűre léphet}(x) \supset \text{kertész}(x)$

hatókör

Ha mindenki otthon marad, dühös leszek.

(minden x -re: $\text{otthon marad}(x) \supset \text{dühös lesz}(\text{én})$)

számosság

Csak egy legény van a gáton.

Van egy legény a gáton.

Néhány legény van a gáton

- egzisztenciaállítással a „legalább egy”-et tudjuk kifejezni
- ha fel akarjuk használni, hogy pontosan egy, vagy több mint egy dologról teszünk állítást, akkor formalizálhatunk egzisztenciális állítással – az információvesztés nem számít
- ha fel akarjuk használni, hogy pontosan egy, vagy több mint egy dologról állítunk valamit, akkor plusz premisszára van szükségünk

ismerkedés

Mindenki megismerkedett mindenkivel. – Pl. egy party-n

- formalizálva: $\forall x \forall y (\text{megismerkedett}(x)(y))$
- hiba: magát már mindenki ismerte
- azonosság predikátummal:
 $\forall x \forall y (\sim x = y \supset \text{megismerkedett}(x)(y))$
- hiba: nem mondunk semmit arról, ha x azonos y -nal
- bikondicionálissal: $\forall x \forall y (\sim x = y \equiv \text{megismerkedett}(x)(y))$

Megjegyzés: az azonosság nem ugyanaz, mint az egyenlőség (pl. két szög lehet egyenlő, de nem azonos)

$a = b$ igaz akkor, és csak akkor, ha a és b faktuális értéke azonos

Azonosság 2.

logikai igazság: minden individuum azonos önmagával

- $\Rightarrow a = a$
- $\Rightarrow \forall x(x = x)$ – nem séma!
- a logikai igazságok nem fejeznek ki információt: a világ bármely állapota esetén igazak

információ: több név is jelölheti ugyan azt az individuumot

- $a = b$

példa

Magyarország legmagasabb pontja a Kékestető.

- nem logikai igazságok: a világ különböző állapotait képesek kifejezni

következtetés:

- $\{F(a), a = b\} \Rightarrow F(b)$
- ez csak extenzionális környezetben igaz! (pl. függő beszédben nem)

Legalább

- legalább egy dologra: $\exists x(Fx)$
- legalább két dologra: $\exists x\exists y(x \neq y \& Fx \& Fy)$
- legalább három dologra:
 $\exists x\exists y\exists z(x \neq y \& x \neq z \& y \neq z \& Fx \& Fy)$
- rövidítve: $\exists_n x(Fx)$ - legalább n dologra

Pontoság

- pontosan egy dologra: $\exists x\forall y(Fy \equiv x = y)$ – unicitás
- pontosan két dologra:
 $\exists x_1\exists x_2(x_1 \neq x_2 \& \forall y(Fy \equiv (y = x_1 \vee y = x_2)))$
- unicitás rövidítése: $\exists!x(Fx)$
- általános rövidítés: $\exists_n!x(Fx)$ – pontosan n dologra

A természetes számok kifejezhetőek azonossággal, számokra hivatkozás nélkül!

példa

*A nő, akivel Jenő teniszezik, csak kezdőkkel teniszezik.
Jenő kezdő.*

- ha következtetést akarunk levonni a deskripcióból, nem formalizálhatjuk tulajdonnévként

névként formalizálva

csak-kezdőkkel-teniszezik(az, akivel Jenő teniszezik)
minden x -re: teniszezik(x)(azzal, akivel Jenő teniszezik) \supset
kezdő(x)

Két lehetőség:

- *deskriptor* operátor bevezetése (nyitott mondatból képez nevet)
- átfogalmazás mondattá
 - ezt motiválja az értékrés elkerülése is

Deskripciót tartalmazó mondatok átfogalmazása egzisztenciális állításokká:

- „A jelenlegi francia király kopasz.” \Leftrightarrow van egy és csak egy jelenlegi francia király, és az kopasz
- Formalizálva:
 - $\exists x (\forall y (Fy \equiv y = x))$ (egzisztenciál formula)
 - $\exists x (\forall y (Fy \equiv y = x) \& Kx)$ (állítás)

Feladatok 1.

6. hét

Mittelholcz Iván

Értékelés

Kvantifikált
állítások

Azonosság

Deskriptó

Formaizáld az alábbi kvantifikált mondatokat:

- Minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár.
- Nincsen rózsza a tövis nélkül.

Hogyan formalizálnád az alábbi mondatokat azonosságperdikátum segítségével?

- Janka vagy Jenőhöz megy feleségül, vagy senkihez.
- Géza csak Jenőt és Jankát ismeri.
- Ha két zsvány beszélget, akkor egy harmadik harmadik hallgat.

Feladatok 2.

6. hét

Mittelholz Iván

Értékelés

Kvantifikált
állítások

Azonosság

Deskripció

Formalizáld az alábbi, deskripciót tartalmazó mondatokat!

- A nővérem Győrben él és rendőr.
- A Győrben élő nővérem rendőr.